非ホジキンリンパ腫　R-CHOEP療法（21日毎）

		Day1	Day2	Day3
投薬	点滴・注射	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■R-CHOEP療法■-day1 【主管】 N/S 250mL … 1袋 ※ﾘﾂｷｻﾝ投与前30分にﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 1T、ｶﾛﾅｰﾙ500 1T 服用 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ■リツキサン(Rituximab)（375mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B ※全量500mlになるよう調製 初回　50ml/h 30分 ____⇒100ml/h　30分 ____⇒150ml/h　30分 ____⇒200ml/h　終了まで投与 2回目以降　100ml/h　30分 ____⇒200ml/h　30分 ____⇒300ml/h　終了まで投与 末梢点滴 … 1 ②【側管】 ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ③【側管】 ■エンドキサン(CPA)（750mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ④【側管】 ■アドリアシン（ADM）（50mg/㎡） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ⑤【側管】 ■オンコビン(VCR) （1.4mg/㎡)(Max2mg/body) N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■R-CHOEP療法■-day2 【主管】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ■ラステット（VP-16）（100mg/㎡） 5%TZ 500ml … 1V （90）分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■R-CHOEP療法■-day3 【主管】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ■ラステット（VP-16）（100mg/㎡） 5%TZ 500ml … 1V （90）分かけて
	内服	■---【投薬】 ■R-CHOEP療法■ 《 day1 ～ 5 》 ◆▼プレドニゾロン錠（5mg） … 20錠 1日2回　朝夕食後 5日		