非ホジキンリンパ腫　R-THP-COP療法（21日毎）

		Day1
投薬	点滴・注射	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■R-THP-COP療法■ N/S 250mL … 1袋 ※ﾘﾂｷｻﾝ投与30分前にﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ1T、ｶﾛﾅｰﾙ錠500mg1T 服用 末梢点滴 … 1 ① ■リツキサン(Rituximab)（375mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」 … 1B ※全量500mlになるよう調製 初回　50ml/h 30分 ____⇒100ml/h　30分 ____⇒150ml/h　30分 ____⇒200ml/h　終了まで投与 2回目以降　100ml/h　30分 ____⇒200ml/h　30分 ____⇒300ml/h　終了まで投与 末梢点滴 … 1 ② ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ③ ■ピノルビン（THP）（THP：40mg/㎡） ﾌﾞﾄﾞｳ糖注5% 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ④ ■オンコビン(VCR) (VCR：1.0mg/㎡)(MAX 2mg/body) N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ⑤ ■エンドキサン(CPA)（CPA：650mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （120）分かけて
	内服	■---【投薬】 ■R-THP-COP療法■ 《 day1 ～ 5 》 ◆▼プレドニゾロン錠（5mg） … 8錠 1日2回　朝夕食後 5日