悪性リンパ腫　Rituximab+Lenalidomide療法（28日毎）　※2クール目からRituximabはDay1のみ

	Day1	Day8	Day15	Day22
点滴	N/S 250mL （ﾃﾙﾓ生食） ※ﾘﾂｷｻﾝ投与前30分に ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 1T、ｶﾛﾅｰﾙ500 1T 服用 リツキサン(Rituximab) （375mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」	N/S 250mL （ﾃﾙﾓ生食） ※ﾘﾂｷｻﾝ投与前30分に ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 1T、ｶﾛﾅｰﾙ500 1T 服用 リツキサン(Rituximab) （375mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」	N/S 250mL （ﾃﾙﾓ生食） ※ﾘﾂｷｻﾝ投与前30分に ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 1T、ｶﾛﾅｰﾙ500 1T 服用 リツキサン(Rituximab) （375mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」	N/S 250mL （ﾃﾙﾓ生食） ※ﾘﾂｷｻﾝ投与前30分に ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 1T、ｶﾛﾅｰﾙ500 1T 服用 リツキサン(Rituximab) （375mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」
内服	Lenalidomide 1日1回　食後 21日			