悪性リンパ腫　Rituximab＋Bendamustine療法（28日毎）

		Day1	Day2
投薬	点滴・注射	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■RB療法■-day1 【主管】 N/S 250mL … 1袋 ※ﾘﾂｷｻﾝ投与前30分にﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 1T、ｶﾛﾅｰﾙ500 1T 服用 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ■リツキサン(Rituximab)（375mg/㎡） N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B ※全量500mlになるよう調製 初回　50ml/h 30分 ____⇒100ml/h　30分 ____⇒150ml/h　30分 ____⇒200ml/h　終了まで投与 2回目以降　100ml/h　30分 ____⇒200ml/h　30分 ____⇒300ml/h　終了まで投与 末梢点滴 … 1 ②【側管】 ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 1A （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ③【側管】 ■トレアキシン（bendamustine）（90mg/㎡） N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （2）時間かけて ※溶解後3時間以内に投与を終了 ※1Vを注射用水40mlで溶解(ﾌｧｼｰﾙ使用) 末梢点滴 … 1 （点滴用）注射用蒸留水　500ml … 1V ※トレアキシン溶解用	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■RB療法■-day2 【主管】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 1A N／S 50mL … 1B （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】 ■トレアキシン（bendamustine）（90mg/㎡） N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （2）時間かけて ※溶解後3時間以内に投与を終了 ※1Vを注射用水40mlで溶解(ﾌｧｼｰﾙ使用) 末梢点滴 … 1 （点滴用）注射用蒸留水　500ml … 1V ※トレアキシン溶解用