悪性リンパ腫　R＋ESHA(P)療法(21日毎)

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
点滴・注射	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■R-ESHAP■-day1 【主管】 N/S 250mL … 1袋 ※ﾘﾂｷｻﾝ投与前30分にﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ 1T、ｶﾛﾅｰﾙ500 1T 服用 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ■リツキサン(Rituximab)(375mg/㎡) N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B ※全量500mLになるように調製 初回　50ml/h 30分 ＿＿⇒100ml/h　30分 ＿＿⇒150ml/h　30分 ＿＿⇒200ml/h　終了まで投与 2回目以降　100ml/h　30分 ＿＿⇒200ml/h　30分 ＿＿⇒300ml/h　終了まで投与 末梢点滴 … 1 ②【側管】 ◆▼ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用 (125mg) … 2瓶 N／S 100mL … 1瓶 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ③【側管】 ■ラステット(VP-16) … 1mg (250mL)テルモ糖注　5% … 1B (60)分かけて (40mg/㎡)	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■R-ESHAP■-day2 【主管】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ◆▼ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用 (125mg) … 2瓶 N／S 100mL … 1瓶 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】 ■ラステット(VP-16) (40mg/㎡) (250mL)テルモ糖注　5% … 1B (60)分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■R-ESHAP■-day3 【主管】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ◆▼ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用 (125mg) … 2瓶 N／S 100mL … 1瓶 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】 ■ラステット(VP-16) (40mg/㎡) (250mL)テルモ糖注　5% … 1B (60)分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■R-ESHAP■-day4 【主管】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ◆▼ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用 (125mg) … 2瓶 N／S 100mL … 1瓶 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】 ■ラステット(VP-16) (40mg/㎡) (250mL)テルモ糖注　5% … 1B (60)分かけて	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■R-ESHAP■-day5 【主管】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL｢NK … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】 ◆▼ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用 (125mg) … 2瓶 N／S 100mL … 1瓶 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ③【側管】 ■キロサイド (Ara-C) (2000mg/㎡) N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B (2)時間かけて